

Tại sao nên thăm khám dưới khi giao hợp với gái mại dâm?

Quan hệ không an toàn có thể mắc các căn bệnh lây qua quan hệ tình dục thí dụ nhiễm trùng, lậu, bệnh mồng gà, bệnh giang mai, nhiễm trùng gan B, HIV...



Đủ thiết bị bệnh từ gái mại dâm

Quan hệ không an toàn là nguyên do dẫn đến rất nhiều lần căn bệnh tình dục cực kỳ hiểm nguy. Trong đấy, số trường hợp nhiễm HIV cũng thí dụ các bệnh hoa liễu thông qua việc quan hệ sở hữu bán dâm cao hơn gấp nhiều lần so sở hữu những nhóm người bệnh khác.

- [Khám bệnh xã hội ở đâu](#)
- [Chi phí xét nghiệm bệnh xã hội](#)
- [Phong kham bệnh lậu](#)
- [Chữa bệnh sùi mào gà ở đâu tốt](#)
- [Địa chỉ chữa bệnh giang mai](#)

Theo bác sĩ Lương T.Phương Nam, [phòng khám Đa khoa Hà Nội](#), bệnh hoa liễu là những bệnh lý hiểm nguy, có khả năng lây lan ngay, phần đa qua những đường giao hợp không được bảo vệ. Theo tìm hiểu, hiện nay có đến 20 mẫu căn bệnh xã hội: bệnh lậu, sùi mào gà, bệnh giang mai, mụn nhọt rộp sinh dục, HIV,...

Bệnh tình dục hầu như lây truyền qua những con đường hàng đầu như:

Giao hợp không an toàn sở hữu những đối tượng mắc những bệnh tình dục khác, nhất là là gái mại dâm;

Dùng chung đồ dùng cá nhân mang các bệnh nhân đang nhiễm phải xã hội;

Bà mẹ mắc phải có thể truyền nhiễm giúp em bé qua con đường nhau thai hoặc đường sinh sản tự nhiên;

Dùng chung bơm kim tiêm hoặc nhận huyết từ bệnh nhân có sở hữu bệnh xã hội trong bệnh nhân.

Những bệnh tình dục này nếu không được hỗ trợ tác dụng tốt sẽ làm cho căn bệnh nặng hơn, lan sang các bộ phận không giống, dẫn tới bệnh vô sinh hiếm muộn, có thể còn đe dọa tính mạng của bệnh nhân.

Quan hệ tình dục sở hữu gái bán dâm là một trong các nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà. Theo bác sĩ Phương Nam khi quan hệ tình dục mang gái bán dâm các bác sĩ chú ý người bệnh cần thiết đi xét nghiệm nhanh chóng vì vì các dịch vụ cung cấp gái mại dâm ngày càng nhiều, đây chủ yếu là một hình thức truyền nhiễm bệnh xã hội vô cùng hiểm nguy. Sở dĩ quan hệ tình dục sở hữu mại dâm có thể lây truyền bệnh xã hội bởi những căn nguyên sau:

Bản thân những cô gái làm nghề gái mại dâm mắc bệnh hoa liễu như là bệnh lậu, bệnh giang mai, HIV, ... Thì khả năng các đàn ông có quan hệ với cô gái này lây truyền căn bệnh là cực kỳ cao, khoảng 90%.

Gái mại dâm hay có quan hệ mang rất nhiều lần đối tượng khác, cô gái này có khả năng bị viêm bệnh xã hội từ những đối tượng khác và lây truyền căn bệnh cho những người giao hợp với chính mình.

Những bệnh xã hội thường có thời điểm ủ bệnh dài-ngắn không giống nhau và hay không có bất kỳ triệu chứng gì trong suốt tầm thời điểm đấy. Vì vậy, có thể thời điểm quan hệ tình dục cả hai tương đối thoải mái và coi nhẹ không dùng những biện pháp sử dụng các biện pháp an toàn.

Xét nghiệm HIV như thế nào?

Đối với vi rút tạo ra các bệnh tình dục có không ít trong huyết, trong những dưỡng chất dịch sinh dục, vì vậy, vi khuẩn có thể xâm nhập tới máu đối tác qua cơ quan sinh dục. Vấn đề sinh hoạt tình dục, hay quan hệ chỉ va chạm bộ phận sinh dục, đều dẫn đến khả năng lây lan nhiễm.

Thời gian giao hợp dương vật-hậu môn là con đường dễ truyền nhiễm viêm nhất, vì "cửa sau" và trực tràng không có dịch trơn thí dụ vùng kín cần phải vô cùng dễ xây xước, khiến virus HIV, HPV... dễ truyền từ người bệnh này sang người kia.

Ngoài xuất, giả dụ bạn hôn cô bé của gái mại dâm bạn sẽ có 2 xác suất như là nếu bạn hôn song chưa tới sâu thì xác suất lây truyền viêm là rất phải chăng, còn trường hợp bạn hôn sâu lên và bạn đang mắc phải lở loét mồm, chảy máu chân răng,... và có tiếp xúc mang sinh dục của cô gái ấy thì bạn đã mắc phải nhiễm HIV, bệnh mồng gà.

Bác sĩ Phương Nam giúp biết, dưới lúc nhiễm trùng HIV, người bệnh sẽ trải qua 3 giai đoạn: liệu trình cửa sổ (3-6 tháng đầu), quá trình HIV không biểu hiện, thời kỳ AIDS. Trong quá trình cửa sổ thì có đến 80% số người nhiễm bệnh không có biểu hiện gì, 20% người có những triệu chứng không đặc trưng như đau đớn đầu, đau đớn vùng họng, mỏi mệt, đau đớn cơ khớp... Nhưng mà các biểu hiện ấy không đặc trưng cần thiết không thể dựa vào đó để có khả năng kết luận có nhiễm HIV luôn đừng nên.

Một bệnh nhân có khả năng có đầy đủ các "dấu hiệu HIV" tuy nhiên thực ra lại không gặp phải, và có nhiều lần bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì, song xét nghiệm lại tìm ra là có HIV trong cơ thể-thì có nghĩa là có gặp phải lây lan nhiễm trùng.